



**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria**  
**Dipartimento Provinciale di Cosenza**  
**Servizio Aria**

# **RETE EDISON DI ALTOMONTE**

## **Aggiornamento dati di Qualità dell'Aria**

### **Anno 2020**



**ARIA**



Report a cura di

Dott.ssa Claudia Tuoto

Dott.ssa Maria Anna Caravita



# Indice:

<b>1 EFFICIENZA DELLA RETE DI RILEVAMENTO</b> .....	2
<b>2 ANDAMENTO METEOROLOGICO NELL'ANNO 2020</b> .....	2
2.1 Temperatura.....	3
2.2 Precipitazioni.....	3
2.3 Velocità e direzione del vento.....	4
2.4 Umidità relativa.....	4
<b>3 DATI RILEVATI NELL'ANNO 2020</b> .....	6
3.1 Ozono.....	6
3.2 Monossido di carbonio.....	7
3.3 PM <sub>10</sub> .....	8
3.4 Biossido di azoto e ossidi di azoto.....	9
3.5 Benzene.....	11
3.6 Superamenti delle soglie di allarme ai sensi del DLgs 155/10 -Episodi acuti-.....	11
<b>4 ANALISI DEI TREND DI CONCENTRAZIONE NEGLI ANNI COMPRESI TRA IL 2006 E IL 2020</b> .....	12
4.1 Ozono.....	12
4.2 Monossido di Carbonio.....	13
4.3 PM <sub>10</sub> .....	13
4.4 Biossido di Azoto.....	14
4.5 Benzene.....	14
<b>5 CONFRONTO TRA I DATI DI QUALITÀ' DELL'ARIA E I VALORI DELLE CONCENTRAZIONI ALLE EMISSIONI</b> .....	15
<b>CONCLUSIONI</b> .....	15



## 1 EFFICIENZA DELLA RETE DI RILEVAMENTO

Il rendimento strumentale viene calcolato come la percentuale dei dati generati e validati rispetto al totale teorico al netto delle tarature periodiche e dell'attività di manutenzione ordinaria preventiva e straordinaria.

Nella tabella seguente vengono riportati i rendimenti degli analizzatori installati nelle stazioni di Firmo e Saracena registrati nel corso dell'anno 2020.

**Tabella 1.** Rendimento delle Stazioni di Firmo e di Saracena relativi all'anno 2020

Inquinante	Stazione di Firmo	Stazione di Saracena
NO, NO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub>	97,6 %	89,0 %
BTX	94,4 %	87,0 %
PM <sub>10</sub>	94,0 %	87,5 %
O <sub>3</sub>	97,2 %	94,6 %
CO	92,7 %	95,4 %

## 2 ANDAMENTO METEOROLOGICO NELL'ANNO 2020

Per l'analisi dei principali parametri meteorologici sono stati utilizzati i dati registrati dalla stazione meteo di Altomonte su cui sono installati i sensori meteo elencati nella tabella seguente che riporta anche i relativi rendimenti.

**Tabella 2.** Rendimento dei parametri meteorologici.

Sensore	Rendimento (%)
Temperatura	98,7%
Pressione atmosferica	98,6%
Umidità relativa	98,7%
Precipitazioni	98,7%
Velocità del vento	98,7%
Direzione del vento	89,6%
Radiazione solare globale	98,7%
Radiazione solare netta	98,7%

Di seguito vengono valutati alcuni parametri meteorologici monitorati che possono essere messi in relazione con i processi di diffusione, trasporto e rimozione dell'inquinamento



## 2.1 Temperatura

Generalmente le temperature elevate possono essere associate ad elevati valori di ozono nel periodo estivo, mentre le basse temperature del periodo invernale, vengono spesso associate a condizioni di inversione termica che tendono a confinare gli inquinanti in prossimità della superficie.

**Tabella 3.** Indicatori relativi alla Temperatura.


Indicatore	Dati
N° di dati validi	8672
Temperatura media annuale	15,9 °C
Massima Temperatura media giornaliera	29,28 °C 31.07.2020
Massima Temperatura media oraria	36,15 °C 31.07.2020 h 12

## 2.2 Precipitazioni

Le precipitazioni e la nebbia possono influenzare la deposizione e la rimozione umida degli inquinanti infatti, la capacità dell'atmosfera di rimuovere l'inquinamento, in particolare le particelle fini, attraverso i processi di deposizione umida e di dilavamento è ridotta dalla mancanza di precipitazioni.

La distribuzione mensile delle precipitazioni, Figura 1, mostra importanti precipitazioni nella stagione invernale e in quella primaverili.

**Figura 1.** Andamento delle Precipitazioni (mm/h)



### 2.3 Velocità e direzione del vento

L'intensità del vento e la direzione di provenienza del vento influenzano il trasporto e la diffusione degli inquinanti. Solitamente la dispersione degli inquinanti immessi vicino alla superficie è favorita da velocità elevate mentre la direzione di provenienza del vento influenza in modo diretto la loro dispersione.

Nella tabella successiva sono riportati alcuni indicatori statistici riferiti alla velocità del vento tra cui anche il massimo valore registrato come media oraria.

**Tabella 4.** Indicatori relativi alla velocità del vento.

Indicatore	Dati
N° di dati validi	8264
Velocità media annuale del vento	6,39 (m/s)
Massima velocità media giornaliera	47,93 (m/s) 21.01.2020
Massima velocità media oraria	74,83 (m/s) 06.02.2020 h 12

### 2.4 Umidità relativa

Nella tabella seguente sono riportati i valori di alcuni indicatori riferiti all'umidità relativa.

**Tabella 5.** Indicatori per l'umidità relativa.

Indicatore	Dati
N° di dati validi	8672
Umidità relativa media	61,2%
Umidità relativa media giornaliera - massima	88,02 % 26.03.2020



Nella tabella seguenti si riportano i dati relativi alle medie mensili della pressione atmosferica, della radiazione solare netta e dell'umidità relativa.

**Tabella 6.** Radiazione solare netta - Pressione atmosferica – Umidità relativa. Valori medi mensili.

Mese	Media mensile Pressione[mbar]	Media mensile Umidità relativa[%]	Media mensile Rad solare netta[W/m2]
Gennaio	1012,36	66,38	34,15
Febbraio	1007,01	58,45	59,26
Marzo	1001,80	65,40	71,76
Aprile	1001,65	58,83	93,80
Maggio	1000,32	56,65	100,88
Giugno	996,26	53,58	121,87
Luglio	997,03	51,03	123,83
Agosto	997,22	50,87	84,49
Settembre	998,88	55,20	72,95
Ottobre	1001,60	64,95	60,24
Novembre	1008,33	74,80	42,71
Dicembre	1000,06	77,80	2,69
<b>Media annuale</b>	<b>1001,81</b>	<b>61,716</b>	<b>71,98</b>



### 3 DATI RILEVATI NELL'ANNO 2020

Nei seguenti paragrafi, per ogni inquinante, vengono mostrati i valori registrati nell'anno 2020 con i limiti previsti dal D, Lgs, 155/2010 s.m.i.

Le valutazioni sono state fatte sui dati validi acquisiti nell'anno considerato e gli andamenti presentati e commentati sono stati elaborati utilizzando la media mensile.

Nell'elaborazione sono presenti dei periodi mancanti in quanto il sistema ha registrato, relativamente a quel intervallo di tempo, una percentuale di dati inferiore a 85%, ciò a causa di problemi tecnico strumentali.

#### 3.1 Ozono

La normativa vigente, per l'ozono, prevede diversi valori limite ossia: l'“obiettivo a lungo termine” (superamento di  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$  della media mobile di 8 ore), il “valore obiettivo” (superamento di  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$  della media mobile di 8 ore da non superare per anno civile come media su 3 anni), la “soglia di informazione” (superamento di  $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) e la “soglia di allarme” che si presenta qualora si verifichi un superamento di  $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$  per tre ore consecutive.

Nella tabella seguente vengono riportati i principali parametri statistici ricavati dai dati registrati nell'anno 2020.

**Tabella 7.** Confronto della concentrazione di Ozono con i limiti previsti dalla normativa

Tabella 7 a.

Stazione	Valore limite (Media oraria)		Massimo valore registrato (Media oraria)
	Soglia di informazione	Soglia di allarme	
Firmo	180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	142,2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (12 aprile h13:00)
Saracena			142,2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (10 aprile h14:00)

Tabella 7 b.

Stazione	Obiettivo a lungo termine (Media massima giornaliera su 8 ore)	Massimo valore registrato (Media massima giornaliera su 8 ore)	N° Medie massime giornaliera su 8 ore > 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Firmo	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ <i>(da non superare per più di 25 giorni per anno civile come media su 3 anni)</i>	133,7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (12 aprile)	3
Saracena		123,8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (10 aprile)	4




Nella figura successiva viene presentato l'andamento della concentrazione di ozono, presso le due stazioni di monitoraggio, espressa come media mensile.

La media nei tre anni 2018-2019-2020 di superamenti di ozono ( $>120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) è pari a 8 giorni per la stazione di Saracena e di 12 giorni per la stazione di Firmo.

I grafici mostrano un andamento pressoché simile con concentrazioni più alte registrate presso la stazione di Firmo.

**Figura 2.** Andamento delle concentrazioni medie mensile dell'Ozono.



### 3.2 Monossido di carbonio

Per tale inquinante la normativa vigente prevede come valore limite il valore di  $10 \text{ mg}/\text{m}^3$  riferito alla media massima giornaliera su 8 ore.

Nella Tabella 8 viene riportato il confronto tra il massimo valore registrato nell'anno 2020, presso entrambe le stazioni di monitoraggio, e il valore limite previsto.


**Tabella 8.** Confronto della concentrazione di CO con i limiti previsti dalla normativa

Stazione	Valore limite (Media massima giornaliera su 8 ore)	Massimo valore registrato (Media massima giornaliera su 8 ore)
Firmo	<b><math>10 \text{ mg}/\text{m}^3</math></b>	<b><math>0,93 \text{ mg}/\text{m}^3</math></b> (17 dicembre)
Saracena		<b><math>2,57 \text{ mg}/\text{m}^3</math></b> (20 settembre)



Per entrambe le stazioni di monitoraggio, la figura seguente mostra il trend annuale della concentrazione di monossido di carbonio espressa come media mensile.

**Figura 3.** Andamento delle concentrazioni medie mensile del Monossido di Carbonio.



### 3.3 PM<sub>10</sub>

Per il particolato PM<sub>10</sub>, nel corso dell'anno 2020, il valore limite è stato rispettato presso entrambi le stazioni della rete infatti, il valore di 50 µg/m<sup>3</sup> come media giornaliera, è stato superato 11 volte nella stazione di Firmo e mai nella stazione di Saracena.

Anche il valore limite come media annuale, pari a 40 µg/m<sup>3</sup>, è stato rispettato in entrambe le stazioni.


**Tabella 9.** Confronto della concentrazione di PM<sub>10</sub> con i limiti previsti dalla normativa

Stazione	Valore limite (Media annuale)	Media annuale registrata	Valore limite (Media su 24 ore)	Massimo valore registrato (Media su 24 ore)	N° medie su 24 ore > 50 µg/m <sup>3</sup>
Firmo	40 µg/m <sup>3</sup>	20,1µg/m <sup>3</sup>	50 µg/m <sup>3</sup> (da non superare più di 35 volte nell'anno)	117,93µg/m <sup>3</sup> (15 maggio)	11
Saracena		11,3 µg/m <sup>3</sup>		44,01µg/m <sup>3</sup> (19 aprile)	0



Nella Figura 4 viene mostrato l'andamento delle concentrazioni medie mensili del PM<sub>10</sub>, registrati nel 2020, presso le stazioni di Firmo e di Saracena. I grafici non evidenziano differenze sostanziali tra le concentrazioni registrate nei due siti di monitoraggio.

**Figura 4.** Andamento delle concentrazioni medie mensile del PM<sub>10</sub>.



### 3.4 Biossido di azoto e ossidi di azoto

Per questo inquinante la tabella seguente mostra che i valori registrati, nell'anno 2020, presso le due stazioni di monitoraggio, sono stati al di sotto dei limiti normativi.

**Tabella10.** Confronto della concentrazione di NO<sub>2</sub> con i limiti previsti dalla normativa

Stazione	Valore limite (Media oraria)	Massimo valore registrato (Media oraria)	Valore limite (Media annuale)	Media annuale registrata
Firmo	200 µg/m <sup>3</sup> <i>(da non superare più di 18 volte per anno civile)</i>	36,03 µg/m <sup>3</sup> (17 dicembre h19:00)	40 µg/m <sup>3</sup>	8,60 µg/m <sup>3</sup>
Saracena		23,24 µg/m <sup>3</sup> (28 giugno h02:00)		4,50 µg/m <sup>3</sup>



Nella tabella seguente viene confrontato il valore limite della media annuale degli ossidi di azoto con la media annuale registrata.


**Tabella 11.** Confronto della concentrazione di NOx con i limiti previsti dalla normativa

<i>Stazione</i>	<i>Valore limite (Media annuale)</i>	<i>Media annuale registrata</i>
<b>Firmo</b>	<b>30,0 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>	<b>13,29 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>Saracena</b>		<b>7,65 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>

Anche per gli ossidi di azoto sono stati registrati valori abbondantemente al di sotto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

La figura seguente mostra l'andamento della concentrazione del biossido di azoto, espressa come media mensile, per le due stazioni di monitoraggio.

**Figura 5.** Andamento delle concentrazioni medie mensile del Biossido di Azoto.



### 3.5 Benzene

Nella tabella 12 vengono confrontati le concentrazioni di benzene rilevate presso le stazioni con i limiti di legge. I valori medi annuali sono nettamente inferiori al valore limite pari a  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

**Tabella 12.** Confronto della concentrazione di Benzene con i limiti previsti dalla normativa

<i>Stazione</i>	<i>Valore limite ( Media annuale)</i>	<i>Media annuale registrata</i>
<b>Firmo</b>	<b><math>5 \mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>	<b><math>0,28 \mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>Saracena</b>		<b><math>0,12 \mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>

Insieme al benzene sono stati monitorati anche altri inquinanti come il toluene, l'etilbenzene e gli xileni, anche se la normativa non impone alcun limite sulla loro presenza in aria.

Nella tabella seguente si riporta la media annuale registrata per ciascuno di questi inquinanti.

**Tabella 13.** Medie annuali registrate per i composti aromatici monitorati

<i>Inquinante</i>	<i>Firmo</i>	<i>Saracena</i>
<b>Toluene</b>	<b><math>0,41 \mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>	<b><math>0,11 \mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>Etilbenzene</b>	<b><math>0,52 \mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>	<b><math>0,01 \mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>O-Xilene</b>	<b><math>1,41 \mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>	<b><math>0,00 \mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>M-P Xilene</b>	<b><math>1,48 \mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>	<b><math>0,01 \mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>

### 3.6 Superamenti delle soglie di allarme ai sensi del DLgs 155/10 -Episodi acuti-

Per il biossido di azoto e l'ozono la normativa fissa anche le soglie di allarme, sui valori delle concentrazioni orarie, corrispondenti a valori di concentrazione tali da determinare effetti acuti sulla popolazione.

Per entrambi i suddetti inquinanti non si sono registrati casi di superamento delle soglie di allarme.




## 4 ANALISI DEI TREND DI CONCENTRAZIONE NEGLI ANNI COMPRESI TRA IL 2006 E IL 2020

Al fine di capire in maniera immediata l'evoluzione della qualità dell'aria nella parte di territorio considerato, vengono presentati, per ogni inquinante, i trend elaborati utilizzando come indicatore la concentrazione media annuale relativi al periodo compreso dal 2006 al 2020.

### 4.1 Ozono

Per l'ozono, è stata registrata una diminuzione della concentrazione media annuale in entrambi i siti monitorati. Infatti, nel 2006 la concentrazione media annuale è stata di 81,31  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  presso la stazione di Firmo e di 86,24  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  presso la stazione di Saracena, nel 2020 i suddetti valori sono stati rispettivamente di 69,0  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  e 53,6  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .


**Figura 6.** Andamento delle concentrazioni medie annuali dell'ozono.



## 4.2 Monossido di Carbonio

L'andamento della concentrazione media annuale del monossido di carbonio mostra un leggero aumento delle concentrazioni negli ultimi due anni in ambedue i due siti di monitoraggio.


**Figura 7.** Andamento delle concentrazioni medie annuali di monossido di carbonio.



## 4.3 PM<sub>10</sub>

Il trend delle medie annuali di PM<sub>10</sub> rientrano abbondantemente nei limiti di legge.


**Figura 8.** Andamento delle concentrazioni medie annuali di PM<sub>10</sub>.



#### 4.4 Biossido di Azoto

L'andamento delle concentrazioni media annuale del biossido di azoto è riportato nel successivo grafico.


**Figura 9.** Andamento delle concentrazioni medie annuali di biossido di azoto.



#### 4.5 Benzene

L'andamento del benzene risulta essere stabile negli ultimi anni.

**Figura 10.** Andamento delle concentrazioni medie annuali di benzene.



## 5 CONFRONTO TRA I DATI DI QUALITÀ DELL'ARIA E I VALORI DELLE CONCENTRAZIONI ALLE EMISSIONI

In questo paragrafo vengono confrontati i dati dei valori delle emissioni presso i due camini della Centrale Termoelettrica EDISON di Altomonte, con i valori di qualità dell'aria registrati nelle due cabine di Firmo e Saracena.

Nella Tabella 14 viene riportato l'andamento annuale della concentrazione del biossido di azoto, espressa come medie mensili in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , rilevata presso le stazioni di monitoraggio, e l'andamento annuale delle concentrazioni di NOx ai due camini della Centrale, espresse come medie mensili in  $\text{mg}/\text{m}^3$ .

**Tabella 14.** Confronto delle concentrazioni medie mensili di NO<sub>2</sub> nell'aria ambiente e di NOx ai camini della Centrale.

Anno 2020	NO <sub>2</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		NOx ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	
	Saracena	Firmo	Camino 1	Camino 2
Gennaio	5,23	7,53	23,9	25,04
Febbraio		6,95	22,89	25,27
Marzo		7,83	22,81	26,28
Aprile	4,09	11,83	23,38	27,75
Maggio		10,23	24,10	
Giugno	3,70	10,45	25,25	24,84
Luglio	4,20	9,99	33,56	25,44
Agosto	4,60	10,78	28,33	25,90
Settembre	4,79	12,00	27,65	24,61
Ottobre	4,10	2,1	28,72	26,16
Novembre	5,66	5,11	28,39	26,65
Dicembre		8,47	29,5	



Le concentrazioni del monossido di carbonio, rilevate nelle due stazioni di monitoraggio e ai due camini della Centrale, entrambe espresse come medie mensili in  $\text{mg}/\text{m}^3$ , sono mostrati nella Tabella 15.

**Tabella 15.** Confronto delle concentrazioni medie mensili di CO nell'aria ambiente e ai camini della Centrale.

Anno 2020	CO ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )		CO ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	
	Saracena	Firmo	Camino 1	Camino 2
Gennaio	1,42	0,42	0,88	1,27
Febbraio	1,16	0,31	1,02	1,35
Marzo		0,32	1,05	1,44
Aprile	1,16	0,31	1,13	1,60
Maggio	1,47	0,41	1,07	1,52
Giugno	1,32	0,19	1,20	
Luglio	1,79	0,46	1,18	1,53
Agosto	2,02	0,40	0,95	1,44
Settembre	2,34	0,46	0,97	1,42
Ottobre	2,07	0,52	1,12	1,76
Novembre	1,87	0,66	1,16	1,47
Dicembre	1,99	0,60	1,17	1,43

Si nota che il funzionamento della Centrale non ha influito in modo significativo sulla concentrazione di  $\text{NO}_2$  e CO nell'aria ambiente.

## CONCLUSIONI

I limiti di legge stabiliti dalla normativa vigente, per gli inquinanti considerati, sono stati rispettati evidenziando, durante gli anni di monitoraggio, una situazione piuttosto stabile per quanto riguarda l'evoluzione della qualità dell'aria.



