PROBLEMATICHE DI SALUTE CONNESSE AGLI INQUINANTI DELL'ARIA

PARCO DELLE BIODIVERSITÀ MEDITERRANEA DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

06 MAGGIO 2016

Dott.ssa Maria Antonietta Soccio

E-mail: mariaantoinetta.soccio@asp.cz.it

“L' **ambiente** è rappresentato da tutti quei fattori che esercitano, direttamente e indirettamente, degli effetti apprezzabili e misurabili sulla salute ed il benessere sia del singolo individuo che delle collettività“ (OMS 1972)

ARIA

Miscela gassosa composta da :

- **OSSIGENO (21 %)**
- **AZOTO (78%)**
- **GAS RARI O NOBILI (1%)**

Tutto ciò che modifica questo **delicato equilibrio** di composti può essere considerato un fattore di rischio per la salute dell'uomo

MACROAMBIENTE: Ambiente Fisico Esterno (outdoor)

Ambiente in cui troviamo gli elementi naturali indispensabili alla nostra vita

MICROAMBIENTE: Ambiente confinato (indoor)

Ambiente in cui si svolgono attività umane non strettamente industriali

Comprende:

- abitazioni
- uffici
- scuole
- ospedali
- luoghi per lo svago e il tempo libero
- mezzi di trasporto

PRINCIPALI FONTI DI INQUINAMENTO OUTDOOR

TRASPORTI 42,2/%

RISCALDAMENTO DOMESTICO 21,4%

CENTRALI TERMICHE 13,7%

PROCESSI INDUSTRIALI 22,7%

PECULIARITA' :

- CONCENTRAZIONE DELLE FONTI INQUINANTI
- FACILE DIFFUSIONE IN ZONE APPARENTEMENTE NON INQUINATE
(*es. ciminiere alte*)
- COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE GENERALE

FONTI DI INQUINAMENTO IN AMBIENTE INDOOR

Fonti

- IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
- MICROCLIMA
- PARTICOLATO
- FUMO PASSIVO

Tipologia

- FISICHE (NIR, rumore, illuminazione,)
- CHIMICHE (CO, SO_x, No_x, IPA, COV)
- BIOLOGICHE (microrganismi, allergeni, miceti, muffe, acari)

- Inquinanti di origine **esterna** agli ambienti di vita: giungono nell'ambiente confinato attraverso l'aria atmosferica
- Inquinanti che si producono all' **interno** degli ambienti confinati: a seguito della presenza e delle abitudini umane o per cessione da materiali di costruzione di edifici e arredi

CLASSIFICAZIONE SORGENTI:

PARAMETRO TECNICO/FUNZIONALE

Sorgente reale:

caratterizzata da un sistema di scarico canalizzato (es. camino)
E' identificabile, misurabile (q) e tramite tecniche corrette è possibile conoscerne le caratteristiche

Sorgente virtuale:

non è possibile misurare le caratteristiche di scarico, né quantificarla (es. discarica)

PERCORSO DEL CONTAMINANTE

SORGENTE

DISPERSIONE

ESPOSIZIONE

DOSE

EFFETTO

EMISSIONE

**AMBIENTE
FISICO ESTERNO**

Dispersione/diluizione

IMMISSIONE

$h = 1,50$

(OMS 1972)

Ricaduta al suolo: ricaduta ad altezza media di un uomo equivalente (1.50 m) a livello delle prime vie aeree (Esposizione via inalatoria)

EMISSIONE

Quantità di sostanza o sostanze che vengono misurate al punto di uscita di una sorgente in un arco di tempo (*peso/tempo*)

E → flusso nel tempo (Kg/ore)

- E = individua quali sono i possibili fattori di rischio
natura: *fisica/chimica*
azione: *tossica, cancerogena, mutagena, irritante,...*

IMMISSIONE

Quantità della stessa/e sostanza/e presenti al punto di ricaduta al suolo in un arco di tempo e in un dato volume di aria (*peso /volume*)

I = concentrazione (mg/m³)

- I = individua quali sono le quantità o i livelli
indicatore diretto di rischio, misura l'entità del rischio (*concentrazione*)

PRINCIPALI INQUINANTI ATMOSFERICI

Sostanze inorganiche:

- Non minerali (CO, O₃, Nox, Sox)
- Minerali (silice , asbesto, metalli *Pb*, *Hg*,...)

Sostanze organiche:

- Organo - Alogenati (Pesticidi DDT, Parathion,..)
- Solventi (Trielina, Metilcloroformio,...)
- Organo metallici (Metil mercurio)
- I.P.A. (Benzene, Toluene, benzo a pirene...)

Particolato atmosferico

PARTICOLATO ATMOSFERICO

PM (Particulate Matter): materiale particellare aerodisperso costituito da aggregati di varie sostanze

Il PM viene utilizzato come indicatore del grado di inquinamento/qualità dell'aria nelle sue frazioni di **PM₁₀** e **PM_{2,5}**

PM₁₀: frazione di particelle con diametro aerodinamico uguale o inferiore a 10µm

- veicolo di numerosi composti organici e inorganici
- PM₁₀ primario: emesso in aria direttamente dalle sorgenti tal quale
- PM₁₀ secondario: si forma in atmosfera attraverso reazioni chimiche con altri inquinanti

PRINCIPALI INQUINANTI ATMOSFERICI E SORGENTI DI EMISSIONE

CO: monossido di carbonio; CO₂: anidride carbonica; NO₂: biossido di azoto; SO₂: biossido di zolfo; HC: idrocarburi incombusti; IPA: idrocarburi policiclici aromatici; COV: composti organici volatili; O₃: ozono

CONCETTO DI TOSSICITA'

Capacità di una sostanza a legarsi a recettori specifici nell'organismo e di indurre lesioni anatomiche o funzionali

LA TOSSICITA' DI UNA SOSTANZA DIPENDE DA:

- **CONCENTRAZIONE**
- **TEMPO DI ESPOSIZIONE**
- **N° DI SOGGETTI COINVOLTI**

POSSONO VERIFICARSI TRE DIVERSE SITUAZIONI:

- **AVVELENAMENTO ACUTO ACCIDENTALE**
- **INTOSSICAZIONE CRONICA**
- **PROBLEMI AMBIENTALI**

FATTORI CHE REGOLANO LA TOSSICITA'

- FATTORI AMBIENTALI
- PROPRIETA' FISICO – CHIMICHE DEL TOSSICO
- MODALITA' DI INTERAZIONE
- FATTORI BIOLOGICI

PROCESSO TOSSICO

ESPOSIZIONE

DISPONIBILITA' DEL TOSSICO AD ESSERE ASSORBITO

TOSSICOCINETICA

ASSORBIMENTO - DISTRIBUZIONE
BIOTRASFORMAZIONE – ESCREZIONE

TOSSICODINAMICA

INTERAZIONE TOSSICO - RECETTORE
DELL'ORGANO BERSAGLIO

RELAZIONE DOSE-EFFETTO

DOSE

QUANTITA' ASSOLUTA DI SOSTANZA CHE VIENE SOMMINISTRATA RIFERITA AD UNA UNITA' DI PESO O DI SUPERFICIE CORPOREA

EFFETTO

ALTERAZIONE BIOCHIMICA, FUNZIONALE O STRUTTURALE INDOTTA DA UNA SOSTANZA CHIMICA

SOGLIA

LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL QUALE UN PRIMO EFFETTO VIENE OSSERVATO

EFFETTI

REVERSIBILI

IRREVERSIBILI

Dose / Tempo di esposizione

- L'ORGANISMO UMANO REAGISCE AGLI STIMOLI SIA ENDOGENI CHE ESOGENI CON SISTEMI DI ADATTAMENTO
- ESAURITA LA CAPACITA' DI COMPENSO SI VA RAPIDAMENTE INCONTRO ALL'INSUFFICIENZA FUNZIONALE

Rappresentazione schematica della possibile via di assorbimento di un inquinante da un sito primario di contatto e destino finale

APPARATO RESPIRATORIO ORGANO BERSAGLIO

Frazione inalabile:

La frazione in massa delle particelle aerodisperse totali che viene inalata attraverso il naso e la bocca.

Frazione toracica:

La frazione in massa delle particelle inalate che penetra oltre la laringe.

Frazione respirabile:

La frazione in massa delle particelle inalate che penetra nelle vie respiratorie non ciliate.

(da UNI ISO 7708, 1998)

Fig. 1 - Le convenzioni inalabile, toracica, respirabile come percentuali delle particelle aerodisperse totali

VIE DI ESCREZIONE

Aria espirata: Composti volatili (ex alcuni anestetici volatili)

Saliva: Sostanze a basso peso molecolare; possibilità di riassorbimento durante il passaggio lungo l'intestino

Bile: Composti ad alto peso molecolare e metalli; in genere metaboliti coniugati con proteine endogene

Feci: Vie di escrezione delle sostanze eliminate con la bile e non riassorbite nell'intestino.

Urine: Principale via di eliminazione dei composti polari a basso peso molecolare

Latte: Principale interesse tossicologico per il neonato

Capelli: Quantitativamente poco rilevante

Gli effetti sanitari dell'inquinamento atmosferico si distinguono in effetti **a breve** e a **lungo termine**

	EFFETTI A BREVE TERMINE	EFFETTI A LUNGO TERMINE
DEFINIZIONE	Effetti osservabili a pochi giorni di distanza dai picchi di inquinamento	Effetti osservabili dopo esposizioni di lunga durata e a distanza dall'inizio dell'esposizione
TIPOLOGIE	<ul style="list-style-type: none">• Sintomi acuti (tosse, dispnea, infezioni respiratorie)• Aggravamento patologie respiratorie e cardiovascolari• Variazioni della funzione respiratoria• Ospedalizzazioni per patologie respiratorie e cardiovascolari• Mortalità respiratoria e cardiovascolare	<ul style="list-style-type: none">• Aumento di incidenza e prevalenza malattie respiratorie croniche (asma, BCPO) e malattie cardiovascolari croniche• Alterazioni permanenti della funzione respiratoria• Tumore polmonare• Problemi al feto (basso peso alla nascita, ritardo di crescita intrauterina)

Effetti diretti

Passaggio di particelle molto fini, gas o metalli,
dai polmoni al sangue

attivazione di un riflesso neurale dall'interazione
tra polveri e recettori polmonari

rapida risposta cardiovascolare all'inquinamento
e l'aumento degli infarti del miocardio e delle aritmie

Effetti indiretti

Gli inquinanti danneggiano l'organismo anche senza agire
direttamente, provocando

stress ossidativo

indebolisce le difese antiossidanti
aumentando le infiammazioni delle vie aeree respiratorie

BPCO, asma e fibrosi cistica

EFFETTI SULLA SALUTE DEI PRINCIPALI INQUINANTI ATMOSFERICI: ***PARTICOLATI***

- **AMIANTO**: costituito da silicati di Mg e Fe, fibre di diversa forma a serpentina o rettilinea, le prime arrivano alle basse vie respiratorie, le seconde alle pleure ➡ **MESOTELIOMA PLEURICO**
- **SILICE**: Processo fibroso cronico polmonare ➡ **SILICOSI**
- **BERILLIO**: Processo granulomatoso polmonare ➡ **BERILLIOSI**

EFFETTI SULLA SALUTE DEI PRINCIPALI INQUINANTI ATMOSFERICI: *SOSTANZE ORGANICHE*

■ IDROCARBURI AROMATICI:

BENZENE ➡ *Cancerogeno*, ed **ETILBENZENE**, **XILENE**,

TOLUENE ➡ *Tossici e nocivi*, presenti come solventi in numerose sostanze di uso comune come vernici e colle.

■ COMPOSTI ORGANO ALOGENATI:

PARATHION, **MALATHION**, **DITHION** ➡ *effetti su apparato respiratorio, rene, fegato, SNC e SNP, cute, sistema riproduttivo*

DDT ➡ *possibile cancerogeno*

EFFETTI SULLA SALUTE CAUSATI DAI PRINCIPALI INQUINANTI

SO₂

- L'esposizione acuta può provocare **rinite, bronchite, infiammazione agli alveoli.**
- Se l'esposizione è prolungata, provoca **broncocostrizione**
- Può aumentare inoltre la viscosità del plasma e la coagulazione del sangue, causando un aumento di **rischio di infarto del miocardio**

NO₂

- E' **irritante** delle vie respiratorie e degli occhi, può raggiungere gli alveoli e provocare **edema polmonare**
- Si combina con l'emoglobina **impedendo il trasporto di ossigeno ai tessuti**

O₃

- E' **irritante delle mucose**, può causare **tosse, mal di testa, edema polmonare**
- Un'esposizione acuta può causare **riduzione della funzione polmonare e iperattività bronchiale**
- **Distrugge l'epitelio delle vie aeree** favorendo l'ingresso di altri inquinanti
- Può essere associato a **processi infiammatori** con possibili **conseguenze cardiovascolari**

PM

- può causare danni respiratori per **azione meccanica**
- veicola nell'organismo altri microinquinanti, come metalli e IPA → possibili effetti mutageni e/o cancerogeni.

(Il PM veicolare è più pericoloso perché produce più radicali liberi rispetto a quello di altre sorgenti determinando maggiore probabilità di effetti mutageni)

L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha inserito il **PM outdoor** tra i **cancerogeni di gruppo 1** (*agenti sicuramente cancerogeni per l'uomo*). IARC Monographs, Volumes 1–112 Last update: 7 April 2015]

- Il D.Lgs n. 155/2010 fissa per il PM_{10} un valore limite annuale di **40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** e un valore limite giornaliero di **50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** da non superare più di 35 volte in un anno
- L'OMS fissa per il PM_{10} e $PM_{2,5}$ valori di riferimento inferiori rispettivamente a **20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** e **10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$**

Tu sei qui: Home page / Classificazioni / Lista delle classificazioni

CLASSIFICHE

Elenco delle classificazioni

- ▶ volumi 1-115
- ▶ Ordine alfabetico
- ▶ Per CAS® numero di registrazione
- ▶ sito Cancer

AGENTI CLASSIFICATO DALLA IARC MONOGRAFIE , VOLUMI 1-115

Gruppo 1	Cancerogeno per l'uomo	118 agenti
Gruppo 2A	Probabilmente cancerogeno per l'uomo	79
Gruppo 2B	Possibilmente cancerogeno per l'uomo	290
Gruppo 3	Non classificabile come sua cancerogenicità per l'uomo	501
Gruppo 4	Probabilmente non cancerogeno per l'uomo	1

Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1–112

CAS No	Agent	Group	Volume	Year
000930-55-2	N-Nitrosopyrrolidine	2B	17, Sup 7	1987
013256-22-9	N-Nitrososarcosine	2B	17, Sup 7	1987
000088-72-2	2-Nitrotoluene	2A	101	2013
	(NB: Overall evaluation upgraded to Group 2A with supporting evidence from other relevant data)			
000099-08-1	Nitrotoluenes	2B	65	1996
000099-99-0				
000099-55-8	5-Nitro-ortho-toluidine	3	48	1990
000804-36-4	Nitrovin	3	31, Sup 7	1987
118399-22-7	Nodularins	3	94	2010
	Non-arsenical insecticides (occupational exposures in spraying and application of)	2A	53	1991
025038-54-4	Nylon 6	3	19, Sup 7	1987
000303-47-9	Ochratoxin A	2B	Sup 7, 56	1993
022966-79-6	Oestradiol mustard	3	9, Sup 7	1987
	Oestrogen (see Estrogen)			
002646-17-5	Oil Orange SS	2B	8, Sup 7	1987
	Opisthorchis felineus (infection with)	3	61	1994
	Opisthorchis viverrini (infection with)	1	61, 100B	2012
	Oral contraceptives, combined estrogen-progestogen (see Estrogen-progestogen oral contraceptives)			
000523-44-4	Orange I (see CI Acid Orange 20)			
001936-15-8	Orange G (see CI Orange G)			
	Outdoor air pollution	1	109	in prep
	Outdoor air pollution, particulate matter in	1	109	in prep

IARC Monographs, Volumes 1–112
Last update: 7 April 2015

Origine PM10

EFFETTI TOSSICOLOGICI SULL'ORGANISMO DEI PRINCIPALI INQUINANTI ATMOSFERICI

INQUINANTE	EFFETTI SULL'ORGANISMO
NOx	irritante azione sinergica con PM
SOx	irritante azione sinergica con PM
O3	irritante azione sinergica con PM
PM	irritante mutageno genotossico cancerogeno
IPA	genotossico cancerogeno azione sinergica con PM
COV	irritante Sensibilizzante genotossico cancerogeno

Autori (ref.)	Frazione PM	Effetti tossicologici
Li et al, 2002 ⁽⁹⁶⁾	PM _{2.5}	irritanti
Fubini et al, 2003 ⁽⁹⁷⁾	PTS	irritanti
Valavanidis et al, 2005 ⁽⁹⁸⁾	PTS	irritanti
Risom et al, 2005 ⁽⁹⁹⁾	PM _{2.5} , PM ₁₀	irritanti
Wu et al, 2002 ⁽¹⁰⁰⁾	PM _{2.5} , PM _{2.5-10}	mutagenicità
Vinitketkumnuen et al, 2002 ⁽¹⁰¹⁾	PM _{2.5} , PM ₁₀	mutagenicità
Binkova et al, 2003 ⁽¹⁰²⁾	PM ₁₀	mutagenicità
Du Four et al, 2004 ⁽¹⁰³⁾	PM ₁₀	mutagenicità
Binkova et al, 2003 ⁽¹⁰²⁾	PM ₁₀	genotossicità (addotti al DNA)
Gabelova et al, 2004 ⁽¹⁰⁴⁾	PM ₁₀	genotossicità (rottura DNA)
Lazarova et al, 2004 ⁽¹⁰⁵⁾	PM ₁₀	genotossicità (rottura DNA)
Risom et al, 2005 ⁽⁹⁹⁾	PM _{2.5} , PM ₁₀	genotossicità (danni da stress ossidativo al DNA)
De Kok et al, 2005 ⁽¹⁰⁶⁾	PTS, PM _{2.5} , PM ₁₀	genotossicità (danni da stress ossidativo al DNA)
Karlsson et al, 2005 ⁽¹⁰⁷⁾	PM ₁₀	genotossicità (rottura DNA)
Binkova et al, 2003 ⁽¹⁰²⁾	PM ₁₀	cancerogenicità
Vera Castellano et al, 2003 ⁽¹⁰⁸⁾	PTS	cancerogenicità

Tabella 12. Evidenze scientifiche dei principali effetti tossicologici del particolato.

VALORI LIMITE DI CONCENTRAZIONE O DI DOSE

■ LINEE GUIDA

■ RACCOMANDAZIONI

■ LIMITI

SI BASANO SU VALIDA DOCUMENTAZIONE

➤ Valutazione scientifica:

tossicologica
sperimentale
clinica

➤ Valutazione politico/morale: qualità e grado di tutela da adottare

LIMITI:

NON SI ANNULLA IL RISCHIO → SI RIDUCE IN MANIERA :

VERIFICABILE (*Monitoraggio ambientale*)

DOCUMENTABILE (*Studi epidemiologici prospettivi di morbosità*)

Periodo di mediazione dati	Valore limite
PM_{2,5}	
media annuale	10µg/m ³
media 24 ore	25µg/m ³
PM₁₀	
media annuale	20µg/m ³
media 24 ore	50µg/m ³
NO₂	
media annuale	40µg/m ³
media 2 ore	200µg/m ³
SO₂	
media 24 ore	20µg/m ³
media 10 minuti	500µg/m ³
O₃	
Media 8 ore	100µg/m ³

Valori limite raccomandati dalle Linee guida OMS

L'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE

- **Studi epidemiologici** hanno dimostrato che abbattere l'inquinamento atmosferico migliora la salute della popolazione
- **La riduzione dei livelli di particolato** è associata a una riduzione del tasso di mortalità, in particolare per malattie respiratorie e cardiovascolari. Lo dimostrano studi europei e statunitensi
- **Meno polveri più vita** la riduzione di $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM2.5 è associata a un aumento nell'aspettativa di vita media di oltre sei mesi

MISURE DI PREVENZIONE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'ARIA

- Riduzione delle fonti di inquinamento
- Adozione delle migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento delle emissioni
- Maggior impiego di energie rinnovabili
- Utilizzo nei processi produttivi di sostanze alternative rispetto a quelle altamente problematiche per la salute e l'ambiente
- Applicazione delle normative comunitarie e nazionali
- Adeguate politiche sanitarie e ambientali
- Uso del territorio secondo standard ottimali (*Assetto urbanistico, destinazioni d'uso del territorio, zone residenziali e industriali*)

The background is a solid blue color with several faint, white, circular patterns. In the top right corner, there is a large circular scale with numbers from 0 to 200 and a dashed line. In the bottom left corner, there is a smaller circular pattern with a dashed line and an arrow. In the bottom right corner, there is another circular pattern with a dashed line and an arrow.

Grazie per l'attenzione!

Dott.ssa Maria Antonietta Soccio

E-mail: mariaantonieta.soccio@asp.cz.it